

| | | |
|-------------------|---|-------------------|
| โรงพยาบาลเกาะช้าง | คู่มือการดูแลผู้ป่วย (CLICAL PRACTICE GUIDELINE) | รหัส : CPG-ER-๐๐๔ |
| | ชื่องาน : แนวทางการดูแลรักษาผู้ถูกเบ็ดเกี่ยว | หน้า ๑ |

| | | |
|--|--|---|
| ผู้จัดทำ : (นางปณัสชดา เพียรหล้า) ผู้จัดทำ | ผู้ทบทวน : (นพ.ชยพล ตริขจรศักดิ์) ผู้ทบทวน | ผู้อนุมัติ : (นพ.ฤชพงศ์ ผู้ภักดี) นายแพทย์ปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงพยาบาลเกาะช้าง |
|--|--|---|



แนวทางเวชปฏิบัติ เรื่อง แนวทางการดูแลรักษาผู้ถูกเบ็ดเกี่ยว

ประวัติการแก้ไข :


จำนวนทั้งหมด ๓ หน้า

| ครั้งที่ | วันที่ประกาศใช้ | รายละเอียด | แผ่นที่ |
|----------|-----------------|--------------------------------|---------|
| ๐๐ | ๒ ก.ค. ๒๕๕๖ | ประกาศใช้เอกสารฉบับแรก | - |
| ๑ | ๓๐ พค ๒๕๕๗ | แก้ไขเอกสารครั้งที่๑ ประกาศใช้ | - |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | |
|-------------------|---|-------------------|
| โรงพยาบาลเกาะช้าง | คู่มือการดูแลผู้ป่วย (CLICAL PRACTICE GUIDELINE) | รหัส : CPG-ER-๐๐๔ |
| | ชื่องาน : แนวทางการดูแลรักษาผู้ถูกเบ็ดเกี่ยว | หน้า ๒ |

แนวทางการดูแลรักษาผู้ถูกเบ็ดเกี่ยว สำหรับรพ.สต.




วิธีถอนเบ็ด แบบที่ ๑



แบบที่ ๒



แบบที่ ๓



| | | |
|-------------------|---|-------------------|
| โรงพยาบาลเกาะช้าง | คู่มือการดูแลผู้ป่วย (CLICAL PRACTICE GUIDELINE) | รหัส : CPG-ER-๐๐๔ |
| | ชื่องาน : แนวทางการดูแลรักษาผู้ถูกเบ็ดเกี่ยว | หน้า ๓ |

การรักษา

๑. ถอดเบ็ดออก
๒. ล้างแผล ใส่ Povidine solution
๓. พิจารณาฉีด วัคซีนป้องกันบาดทะยัก
๔. ให้ยาปฏิชีวนะ Dicloxa(๒๕๐) ๑*๔ oral ac ๕-๗ day
๕. ให้ยาแก้ปวด Para (๕๐๐) ๒ tabs Oral prn , Ibuprofen ๑*๓ Oral pc ถ้าปวดมาก